

# 3

## 使用上の注意の改訂について (その221)

平成22年10月26日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意（本号の「2 重要な副作用等に関する情報」で紹介したものを除く。）について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせいたします。

### 1 〈血圧降下剤〉 アリスキレンフマル酸塩

[販 売 名] ラジレス錠150mg（ノバルティスファーマ）

[禁 忌] イトラコナゾール、シクロスポリンを投与中の患者

[相 互 作 用  
(併用禁忌)] イトラコナゾール

### 2 〈その他の消化器官用薬〉 ラモセトロン塩酸塩（経口剤2.5 $\mu$ g, 5 $\mu$ g）

[販 売 名] イリボー錠2.5 $\mu$ g, 同錠5 $\mu$ g（アステラス製薬）

[重要な基本的注意] 虚血性大腸炎や重篤な便秘が発現するおそれがあるので、腹痛、血便、便秘、硬便が認められた場合には、医師等に連絡するよう患者に指導すること。

[副作用  
(重大な副作用)] 虚血性大腸炎：虚血性大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、血便等虚血性大腸炎が疑われる症状があらわれた場合には、本剤の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 3 〈その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬〉 イミダフェナシン

[販 売 名] ウリトス錠0.1mg（杏林製薬）、ステーブラ錠0.1mg（小野薬品工業）

[副作用  
(重大な副作用)] 尿閉：尿閉があらわれることがあるので、観察を十分に行い、症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

---

## 4 〈その他の腫瘍用薬，放射性医薬品〉 イットリウム（<sup>90</sup>Y）イブリツモマブチウキセタン（遺伝子組換え） インジウム（<sup>111</sup>In）イブリツモマブチウキセタン（遺伝子組換え）

[販 売 名]	ゼヴァリン イットリウム（ <sup>90</sup> Y）静注用セット（バイエル薬品） ゼヴァリン インジウム（ <sup>111</sup> In）静注用セット（バイエル薬品）
[副作用 (重大な副作用)]	<u>感染症</u> ：敗血症，肺炎等の重篤な感染症があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

---

## 5 〈その他の腫瘍用薬〉 ソラフェニブトシル酸塩

[販 売 名]	ネクサバル錠200mg（バイエル薬品）
[副作用 (重大な副作用)]	<u>消化管穿孔，消化管潰瘍</u> ：消化管穿孔，消化管潰瘍があらわれることがあり，消化管穿孔により死亡に至る例が報告されているので，消化管穿孔，消化管潰瘍が疑われた場合には，本剤の投与を中止するなど，適切な処置を行うこと。 <u>ショック，アナフィラキシー様症状</u> ：ショック，アナフィラキシー様症状（呼吸困難，血管浮腫，発疹，血圧低下等）があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には，本剤の投与を中止し，適切な処置を行うこと。 <u>横紋筋融解症</u> ：横紋筋融解症があらわれることがあるので，観察を十分に行い，筋肉痛，脱力感，CK（CPK）上昇，血中及び尿中ミオグロビン上昇等が認められた場合には，投与を中止し，適切な処置を行うこと。また，横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。

---

## 6 〈主としてグラム陽性菌に作用するもの〉 バンコマイシン塩酸塩（眼科用剤）

[販 売 名]	バンコマイシン眼軟膏1%（東亜薬品）
[副作用 (重大な副作用)]	<u>角膜障害</u> ：びらん等の角膜上皮障害が発現することがあるので，観察を十分に行い，症状があらわれた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

---

## 7 〈その他の化学療法剤〉 イトラコナゾール

[販 売 名]	イトリゾールカプセル50，同内用液1%，同注1%（ヤンセンファーマ）他
[禁 忌]	ピモジド，キニジン，ベプリジル，トリアゾラム，シンバスタチン，アゼルニジピン，ニソルジピン，エルゴタミン，ジヒドロエルゴタミン，バルデナフィル，エプレレノン，プロナンセリン，シルデナフィル（レバチオ），タダラフィル（アドシルカ）， <u>アリスキレン</u> を投与中の患者
[相 互 作 用 (併用禁忌)]	<u>アリスキレン</u>

---

---

## 8 一般用医薬品 荊芥連翹湯 二朮湯

- [販 売 名] ツムラ漢方荊芥連翹湯エキス顆粒（ツムラ）他  
二朮湯「タキザワ」（タキザワ漢方廠）他
- [相談すること] 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること  
服用後、次の症状があらわれた場合  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。  
間質性肺炎：せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
- 

## 9 一般用医薬品 竜胆瀉肝湯

- [販 売 名] JPS竜胆瀉肝湯エキス錠N（ジェーピーエス製薬）他
- [相談すること] 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること  
服用後、次の症状があらわれた場合  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。  
肝機能障害：全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
-