

3

使用上の注意の改訂について (その243)

平成25年1月8日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意（本号の「2 重要な副作用等に関する情報」で紹介したものを除く。）について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせいたします。

1 <糖尿病用剤> グリメピリド ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド

[販売名] アマリール0.5mg, 同錠1mg, 同錠3mg（サノフィ）他
ソニアス配合錠LD, 同配合錠HD（武田薬品工業）

[副作用
(重大な副作用)] 汎血球減少, 無顆粒球症, 溶血性貧血, 血小板減少：汎血球減少, 無顆粒球症, 溶血性貧血,
血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投
与を中止し、適切な処置を行うこと。

2 <主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの> セフォゾラン塩酸塩

[販売名] ファーストシン静注用0.5g, 同静注用1g, 同静注用1gバッグS, 同静注用1gバッグG（武
田薬品工業）

[副作用
(重大な副作用)] 汎血球減少, 無顆粒球症, 顆粒球減少, 血小板減少があらわれることがあり、また、他のセ
フェム系抗生物質で溶血性貧血があらわれることが報告されているので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

3 <主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの> セフォチアム塩酸塩

[販売名] パンスポリン静注用0.25g, 同静注用0.5g, 同静注用1g, 同静注用1gバッグS, 同静注用1g
バッグG, 同筋注用0.25g（武田薬品工業）、ハロスポア静注用0.25g, 同静注用0.5g, 同静注
用1g（富山化学工業）他

[副作用
(重大な副作用)] 汎血球減少, 無顆粒球症, 顆粒球減少, 溶血性貧血, 血小板減少：汎血球減少, 無顆粒球症,
顆粒球減少, 溶血性貧血, 血小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異
常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

4 <抗ウイルス剤>
アタザナビル硫酸塩
アバカビル硫酸塩
インジナビル硫酸塩エタノール付加物
エトラビリン
エファビレンツ
エムトリシタビン
エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシシルフマル酸塩
サキナビルメシル酸塩
サニルブジン
ジダノシン
ジドブジン
ジドブジン・ラミブジン
ダルナビルエタノール付加物
テノホビルジソプロキシシルフマル酸塩
ネビラピン
ネルフィナビルメシル酸塩
ホスアンプレナビルカルシウム水和物
マラビロク
ラミブジン (150mg・300mg)
ラミブジン・アバカビル硫酸塩
ラルテグラビルカリウム
リトナビル
リルピビリン塩酸塩
ロピナビル・リトナビル

[販 売 名]	レイアタツカプセル150mg, 同カプセル200mg (ブリストル・マイヤーズ)
	ザイアジェン錠300mg (ヴィーブヘルスケア)
	クリキシバンカプセル200mg (MSD)
	インテレンス錠100mg (ヤンセンファーマ)
	ストックリン錠200mg, 同錠600mg (MSD)
	エムトリバカプセル200mg (日本たばこ産業)
	ツルバダ配合錠 (日本たばこ産業)
	インビラーゼカプセル200mg, 同錠500mg (中外製薬)
	ゼリットカプセル15, 同カプセル20 (ブリストル・マイヤーズ)
	ヴァイデックスECカプセル125, 同カプセル200 (ブリストル・マイヤーズ)
	レトロビルカプセル100mg (ヴィーブヘルスケア)
	コンビビル配合錠 (ヴィーブヘルスケア)
	プリジスタ錠300mg, 同ナイーブ錠400mg (ヤンセンファーマ)
	ビリアード錠300mg (日本たばこ産業)
	ビラミューン錠200 (日本ベーリンガーインゲルハイム)
	ビラセプト錠250mg (日本たばこ産業)
	レクシヴァ錠700 (ヴィーブヘルスケア)

シーエルセントリ錠150mg（ヴィーブヘルスケア）
エピビル錠150, 同錠300（ヴィーブヘルスケア）
エプジコム配合錠（ヴィーブヘルスケア）
アイセントレス錠400mg（MSD）
ノービア錠 100mg, 同内用液 8%（アボットジャパン）
エジュラント錠25mg（ヤンセンファーマ）
カレトラ配合錠, 同配合内用液（アボットジャパン）

[重要な基本的注意]

本剤を含む抗HIV薬の多剤併用療法を行った患者で、免疫再構築症候群が報告されている。投与開始後、免疫機能が回復し、症候性のみならず無症候性日和見感染（マイコバクテリウムアビウムコンプレックス、サイトメガロウイルス、ニューモシスチス等によるもの）等に対する炎症反応が発現することがある。また、免疫機能の回復に伴い自己免疫疾患（甲状腺機能亢進症、多発性筋炎、ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎等）が発現するとの報告があるので、これらの症状を評価し、必要時には適切な治療を考慮すること。

5 一般用医薬品 竜胆瀉肝湯

[販売名] 竜胆瀉肝湯エキス錠クラシエ（クラシエ製薬）他
[相談すること] 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
