

■問題状況(複数回答) [図表10]

	1～6級地							
	医療区分1 (n=1,081)		医療区分2 (n=1,831)		医療区分3 (n=798)		全 体 (n=3,710)	
1. 脱水	29	2.7%	140	7.6%	140	17.5%	309	8.3%
2. 妄想	12	1.1%	67	3.7%	13	1.6%	92	2.5%
3. 発熱	11	1.0%	162	8.8%	279	35.0%	452	12.2%
4. 幻覚	11	1.0%	37	2.0%	20	2.5%	68	1.8%
5. 嘔吐	6	0.6%	25	1.4%	37	4.6%	68	1.8%
6. 胸水	3	0.3%	21	1.1%	47	5.9%	71	1.9%
7. 腹水	4	0.4%	8	0.4%	8	1.0%	20	0.5%
8. 消化管の通過障害（癌を伴う）	1	0.1%	10	0.5%	9	1.1%	20	0.5%
9. 消化管等の体内出血<新規>	0	0.0%	16	0.9%	21	2.6%	37	1.0%
10. 貧血<新規>	26	2.4%	85	4.6%	70	8.8%	181	4.9%
11. めまい<新規>	12	1.1%	23	1.3%	5	0.6%	40	1.1%
12. 便秘<新規>	210	19.4%	625	34.1%	280	35.1%	1,115	30.1%
13. 尿、便失禁<新規>	395	36.5%	1,114	60.8%	581	72.8%	2,090	56.3%

	その他の地域							
	医療区分1 (n=1,462)		医療区分2 (n=1,989)		医療区分3 (n=765)		全 体 (n=4,216)	
1. 脱水	14	1.0%	66	3.3%	75	9.8%	155	3.7%
2. 妄想	23	1.6%	78	3.9%	18	2.4%	119	2.8%
3. 発熱	25	1.7%	188	9.5%	242	31.6%	455	10.8%
4. 幻覚	17	1.2%	55	2.8%	11	1.4%	83	2.0%
5. 嘔吐	6	0.4%	25	1.3%	29	3.8%	60	1.4%
6. 胸水	8	0.5%	35	1.8%	51	6.7%	94	2.2%
7. 腹水	2	0.1%	9	0.5%	11	1.4%	22	0.5%
8. 消化管の通過障害（癌を伴う）	0	0.0%	11	0.6%	9	1.2%	20	0.5%
9. 消化管等の体内出血<新規>	0	0.0%	12	0.6%	18	2.4%	30	0.7%
10. 貧血<新規>	40	2.7%	99	5.0%	72	9.4%	211	5.0%
11. めまい<新規>	9	0.6%	14	0.7%	3	0.4%	26	0.6%
12. 便秘<新規>	333	22.8%	639	32.1%	205	26.8%	1,177	27.9%
13. 尿、便失禁<新規>	641	43.8%	1,044	52.5%	441	57.6%	2,126	50.4%

■処置・治療（複数回答） [図表11]

	1～6級地							
	医療区分1 (n=1,081)		医療区分2 (n=1,831)		医療区分3 (n=798)		全 体 (n=3,710)	
1. 抗がん剤療法	1	0.1%	7	0.4%	1	0.1%	9	0.2%
2. 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	100	9.3%	447	24.4%	227	28.4%	774	20.9%
3. 放射線治療	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
4. 吸引（1日1～7回）	56	5.2%	141	7.7%	127	15.9%	324	8.7%
5. 輸血	0	0.0%	4	0.2%	12	1.5%	16	0.4%
6. 緩和ケア	4	0.4%	17	0.9%	10	1.3%	31	0.8%
7. 疼痛コントロール	17	1.6%	53	2.9%	24	3.0%	94	2.5%
8. 膀胱留置カテーテル	62	5.7%	184	10.0%	216	27.1%	462	12.5%
9. 血糖チェック（週1回～1日2回）	30	2.8%	273	14.9%	147	18.4%	450	12.1%
10. インスリン皮下注射	12	1.1%	152	8.3%	58	7.3%	222	6.0%

	その他の地域							
	医療区分1 (n=1,462)		医療区分2 (n=1,989)		医療区分3 (n=765)		全 体 (n=4,216)	
1. 抗がん剤療法	3	0.2%	4	0.2%	3	0.4%	10	0.2%
2. 胃瘻、腎瘻、人工肛門などの瘻の処置	112	7.7%	359	18.0%	178	23.3%	649	15.4%
3. 放射線治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4. 吸引（1日1～7回）	89	6.1%	128	6.4%	86	11.2%	303	7.2%
5. 輸血	0	0.0%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.1%
6. 緩和ケア	5	0.3%	14	0.7%	13	1.7%	32	0.8%
7. 疼痛コントロール	28	1.9%	54	2.7%	25	3.3%	107	2.5%
8. 膀胱留置カテーテル	71	4.9%	241	12.1%	227	29.7%	539	12.8%
9. 血糖チェック（週1回～1日2回）	34	2.3%	220	11.1%	88	11.5%	342	8.1%
10. インスリン皮下注射	33	2.3%	164	8.2%	52	6.8%	249	5.9%

■状態の安定性（複数回答） [図表12]

	1～6級地							
	医療区分1 (n=1,081)		医療区分2 (n=1,831)		医療区分3 (n=798)		全 体 (n=3,710)	
1. 個室における管理が必要	9	0.8%	20	1.1%	48	6.0%	77	2.1%
2. 急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	22	2.0%	79	4.3%	138	17.3%	239	6.4%
3. 末期の疾患であり、余命が6ヵ月以下である	6	0.6%	18	1.0%	51	6.4%	75	2.0%
4. 床上安静の指示あり<新規>	36	3.3%	132	7.2%	64	8.0%	232	6.3%

	その他の地域							
	医療区分1 (n=1,462)		医療区分2 (n=1,989)		医療区分3 (n=765)		全 体 (n=4,216)	
1. 個室における管理が必要	9	0.6%	18	0.9%	68	8.9%	95	2.3%
2. 急性症状が発生したり再発性や慢性の問題が再燃した	13	0.9%	45	2.3%	113	14.8%	171	4.1%
3. 末期の疾患であり、余命が6ヵ月以下である	4	0.3%	19	1.0%	58	7.6%	81	1.9%
4. 床上安静の指示あり<新規>	39	2.7%	65	3.3%	81	10.6%	185	4.4%