

令和4年度 厚生労働省委託事業 新型コロナワクチン接種後健康状況調査

中間報告（2021/11/2～2022/09/11）

調査概要

調査結果

- I. アンケート回答者
 1. 接種1回目当日
 2. 接種1回目1週目
 3. 接種1回目2週目
 4. 接種2回目当日
 5. 接種2回目1週目
 6. 接種2回目2週目
 7. 接種3回目当日
 8. 接種3回目1週目
 9. 接種3回目2週目
 10. 接種4回目当日
 11. 接種4回目1週目
 12. 接種4回目2週目
- II. 症状別

ワクチン接種会場にてリーフレット配布しアプリより回答



このアプリでは、接種期間中に新型コロナウイルス接種（追加接種又は追加接種）を受けた方と接種後一定期間経過後に接種後健康状況を把握いたします。この結果を集約・分析し、ワクチン接種後の健康状況に関する情報を提供してまいります。

待機時間内にかんたんエントリー！

①ダウンロード・登録

「アンケート回答はアプリから」が便利です

App Store

②初期フォーム取得

①-接種前 ②-接種後

アプリのインストール後はQRコードでダウンロード画面が表示されます

③アンケート

このアプリは厚生労働省の委託により、株式会社「データヘルス未来研究所」が開発・運営しています。お問い合わせ先は株式会社「データヘルス未来研究所」です。



アンケート回答 & 医師相談について



アンケート回答手順



医師相談手順




接種会場における QRコード、お申し込み画面はこちら


QRコード:

お申し込み画面:


接種日アンケート有効（回答日 = 接種日）を母数とする



接種日アンケート有効（回答日 = 接種日）を母数とする



回答フェーズで全体、メーカー別、性別、世代別に分析



本調査の特性及び本資料掲載データの閲覧にあたっての留意点

■調査の特性

本調査は被接種者のうち、参加に同意いただいた者が任意で回答したものについて集計し、公表している。

■留意点

- 本調査の開始時期や、本調査の実施形態（スマートフォン上で動作するオンラインツールを活用した調査）に鑑み、参加者の年齢や属性等に偏りが生じる可能性があることに留意する必要がある。
- 本調査においては、症状が出なかった場合にも、「症状が出なかった」ことについて回答を求めているが、症状が出た方が回答しやすい（症状が出なかった方は回答を棄権しやすい）可能性が考えられる。
- 症状の発現頻度の算出にあたっては、回答が得られた者のうち、症状が出た者を症状の発現頻度としていることから、結果として、発現頻度が高く算出される傾向が想定されることについて留意が必要である。
- 本調査においては、接種当日中のエントリー及びアンケート回答を有効回答として取り扱っているが、2022年3月27日データロックの中間報告分より、算定の基準としていた時刻が協定世界時（UTC）から日本標準時（JST）に変更された。このため、それ以前の中間報告において有効回答とされていた一部のデータが無効回答に、あるいは逆に無効回答とされていた一部のデータが有効回答に変更されていることに留意が必要である。

調査概要


調査結果

- I. アンケート回答者
 1. 接種1回目当日
 2. 接種1回目1週目
 3. 接種1回目2週目
 4. 接種2回目当日
 5. 接種2回目1週目
 6. 接種2回目2週目
 7. 接種3回目当日
 8. 接種3回目1週目
 9. 接種3回目2週目
 10. 接種4回目当日
 11. 接種4回目1週目
 12. 接種4回目2週目
- II. 症状別

1-2.分析の対象（接種1回目当日）

接種1回目接種日アンケート


凡例：
 自分...本人が回答
 自分以外...家族が代理で回答
 有効...回答日 = 接種日
 無効...回答日 ≠ 接種日




接種日当日中エントリー・回答: 4322人 (内 有効回答者数:3601人 無効回答者数:721人)

1-3.特性_全体（接種1回目当日）

年代別-接種1回目当日




性別-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者：N=3901

1-4.特性_全体（接種1回目当日）

ワクチンメーカー別-接種1回目当日




都道府県別-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者:54,380

1-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種1回目当日）

年代別(ファイザー)-接種1回目当日




性別(ファイザー)-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者(ファイザー)：N=3193

1-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種1回目当日）

年代別(モデルナ)-接種1回目当日




性別(モデルナ)-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者(モデルナ), N=340

1-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目当日）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目当日




性別（アストラゼネカ）-接種1回目当日




接種1回目当日アンケート回答者(アストラゼネカ) :N=5

1-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種1回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種1回目当日



接種1回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=88

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

2-2.分析の対象（接種1回目1週間後）


接種1回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 3601人 内 回答有:1489人 回答無:2112人(回答率41.3%)

2-3.特性_全体（接種1回目1週間後）

年代別-接種1回目1週間後




性別-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1499

2-4.特性_全体（接種1回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種1回目1週間後




都道府県別-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1499

2-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種1回目1週間後）

年代別(ファイザー)-接種1回目1週間後




性別(ファイザー)-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者(ファイザー) N=1298

2-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種1回目1週間後）

年代別(モデルナ)-接種1回目1週間後




性別(モデルナ)-接種1回目1週間後



接種1回目1週間後アンケート回答者(モデルナ) N=138

2-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目1週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目1週間後




性別（アストラゼネカ）-接種1回目1週間後




接種1回目1週間後アンケート回答者(アストラゼネカ) : N=2

2-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種1回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種1回目1週間後



接種1回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=54

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

3-2.分析の対象（接種1回目2週間後）

接種1回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 3590人 内 回答有:1384人 回答無:2206人(回答率38.6%)

3-3.特性_全体（接種1回目2週間後）

年代別-接種1回目2週間後




性別-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

3-4.特性_全体（接種1回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種1回目2週間後




都道府県別-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

3-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種1回目2週間後）

年代別(ファイザー)-接種1回目2週間後




性別(ファイザー)-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者(ファイザー):N=1211

3-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種1回目2週間後）

年代別(モデルナ)-接種1回目2週間後




性別(モデルナ)-接種1回目2週間後



接種1回目2週間後アンケート回答者(モデルナ):N=119

3-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種1回目2週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種1回目2週間後




性別（アストラゼネカ）-接種1回目2週間後




接種1回目2週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

3-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種1回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス）)-接種1回目2週間後



性別（武田（ノババックス）)-接種1回目2週間後



接種1回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=52

調査概要

調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

4-2.分析の対象（接種2回目当日）

接種2回目接種日アンケート

凡例：
 自分...本人が回答
 自分以外...家族が代理で回答
 有効...回答日 = 接種日
 無効...回答日 ≠ 接種日



接種当日アンケート回答日


接種日当日中エントリー・回答: 1072人 (内 有効回答者数: 733人 無効回答者数: 339人)

4-3.特性_全体（接種2回目当日）

年代別-接種2回目当日




性別-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者: N=733

4-4.特性_全体（接種2回目当日）

ワクチンメーカー別-接種2回目当日



都道府県別-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者: N=733

4-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種2回目当日）

年代別(ファイザー)-接種2回目当日




性別(ファイザー)-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者(ファイザー), N=547

4-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種2回目当日）

年代別(モデルナ)-接種2回目当日




性別(モデルナ)-接種2回目当日



接種2回目当日アンケート回答者(モデルナ):N=57

4-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目当日）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目当日




性別（アストラゼネカ）-接種2回目当日




接種2回目当日アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=2

4-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種2回目当日



接種2回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=27

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

5-2.分析の対象（接種2回目1週間後）


接種2回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者: 732人 内 回答有: 546人 回答無: 186人(回答率74.6%)

5-3.特性_全体（接種2回目1週間後）

年代別-接種2回目1週間後



性別-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者: N=545

5-4.特性_全体（接種2回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種2回目1週間後




都道府県別-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=545

5-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種2回目1週間後）

年代別(ファイザー)-接種2回目1週間後




性別(ファイザー)-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者(ファイザー):N=482

5-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種2回目1週間後）

年代別(モデルナ)-接種2回目1週間後




性別(モデルナ)-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者(モデルナ):N=40

5-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目1週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目1週間後




性別（アストラゼネカ）-接種2回目1週間後




接種2回目1週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=1

5-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目1週間後）

年代別(武田(ノババックス))-接種2回目1週間後



性別(武田(ノババックス))-接種2回目1週間後



接種2回目1週間後アンケート回答者(武田(ノババックス)):N=23

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
- 6. 接種2回目2週目**
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

6-2.分析の対象（接種2回目2週間後）


接種2回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 732人 内 回答有: 509人 回答無: 223人(回答率69.5%)

6-3.特性_全体（接種2回目2週間後）

年代別-接種2回目2週間後




性別-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者: N=508

6-4.特性_全体（接種2回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種2回目2週間後




都道府県別-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者: N=508

6-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種2回目2週間後）

年代別(ファイザー)-接種2回目2週間後




性別(ファイザー)-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者(ファイザー) : N=448

6-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種2回目2週間後）

年代別(モデルナ)-接種2回目2週間後




性別(モデルナ)-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者(モデルナ):N=39

6-7.特性_メーカー別：アストラゼネカ（接種2回目2週間後）

年代別（アストラゼネカ）-接種2回目2週間後




性別（アストラゼネカ）-接種2回目2週間後




接種2回目2週間後アンケート回答者（アストラゼネカ）：N=1

6-8.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種2回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種2回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種2回目2週間後



接種2回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））：N=21

調査概要

調査結果

I. アンケート回答者


1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

7-2.分析の対象（接種3回目当日）

接種3回目接種日アンケート

凡例：
 自分...本人が回答
 自分以外...家族が代理で回答
 有効...回答日 = 接種日
 無効...回答日 ≠ 接種日




接種当日アンケート回答日


接種日当日中エントリー・回答: 2198人 (内 有効回答者数:1888人 無効回答者数:310人)

7-3.特性_全体（接種3回目当日）

年代別-接種3回目当日




性別-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者：N=1098

7-4.特性_全体（接種3回目当日）

ワクチンメーカー別-接種3回目当日




都道府県別-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者：N=1098

7-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種3回目当日）

年代別(ファイザー)-接種3回目当日




性別(ファイザー)-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者(ファイザー) N=313

7-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種3回目当日）

年代別(モデルナ)-接種3回目当日




性別(モデルナ)-接種3回目当日




接種3回目当日アンケート回答者(モデルナ)：N=1358

7-7.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目当日）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目当日



性別（武田（ノババックス））-接種3回目当日



接種3回目当日アンケート回答者（武田（ノババックス））, N=216

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

8-2.分析の対象（接種3回目1週間後）


接種3回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者：1887人 内 回答有：859人 回答無：1028人(回答率45.5%)

8-3.特性_全体（接種3回目1週間後）

年代別-接種3回目1週間後




性別-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者：N=959

8-4.特性_全体（接種3回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種3回目1週間後




都道府県別-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者: N=859

8-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種3回目1週間後）

年代別(ファイザー)-接種3回目1週間後




性別(ファイザー)-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者(ファイザー) N=140

8-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種3回目1週間後）

年代別(モデルナ)-接種3回目1週間後




性別(モデルナ)-接種3回目1週間後




接種3回目1週間後アンケート回答者(モデルナ) N=582

8-7.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目1週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目1週間後



性別（武田（ノババックス））-接種3回目1週間後



接種3回目1週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））,N=137

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

9-2.分析の対象（接種3回目2週間後）


接種3回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者: 1887人 内 回答有: 834人 回答無: 1053人(回答率44.2%)

9-3.特性_全体（接種3回目2週間後）

年代別-接種3回目2週間後




性別-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者: N=634

9-4.特性_全体（接種3回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種3回目2週間後




都道府県別-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者: N=634

9-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種3回目2週間後）

年代別(ファイザー)-接種3回目2週間後




性別(ファイザー)-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者(ファイザー) N=140

9-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種3回目2週間後）

年代別(モデルナ)-接種3回目2週間後




性別(モデルナ)-接種3回目2週間後




接種3回目2週間後アンケート回答者(モデルナ)：n=553

9-7.特性_メーカー別：武田（ノババックス）（接種3回目2週間後）

年代別（武田（ノババックス））-接種3回目2週間後



性別（武田（ノババックス））-接種3回目2週間後



接種3回目2週間後アンケート回答者（武田（ノババックス））,N=128

調査概要

調査結果

I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

10-2.分析の対象（接種4回目当日）

接種4回目接種日アンケート


凡例：
 自分...本人が回答
 自分以外...家族が代理で回答
 有効...回答日 = 接種日
 無効...回答日 ≠ 接種日




接種日当日中エントリー・回答: 565人 (内 有効回答者数:471人 無効回答者数:94人)

10-3.特性_全体（接種4回目当日）

年代別-接種4回目当日




性別-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者: N=471

10-4.特性_全体（接種4回目当日）

ワクチンメーカー別-接種4回目当日




都道府県別-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者: N=471

10-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種4回目当日）

年代別(ファイザー)-接種4回目当日




性別(ファイザー)-接種4回目当日




接種4回目当日アンケート回答者(ファイザー):N=51

10-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種4回目当日）

年代別(モデルナ)-接種4回目当日



性別(モデルナ)-接種4回目当日



接種4回目当日アンケート回答者(モデルナ) N=423

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

11-2.分析の対象（接種4回目1週間後）


接種4回目1週目アンケート




接種より1週間経過回答対象者：462人 内 回答有：183人 回答無：279人(回答率39.6%)

11-3.特性_全体（接種4回目1週間後）

年代別-接種4回目1週間後




性別-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者: N=153

11-4.特性_全体（接種4回目1週間後）

ワクチンメーカー別-接種4回目1週間後




都道府県別-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者: N=153

11-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種4回目1週間後）

年代別(ファイザー)-接種4回目1週間後




性別(ファイザー)-接種4回目1週間後




接種4回目1週間後アンケート回答者(ファイザー):N=24

11-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種4回目1週間後）

年代別(モデルナ)-接種4回目1週間後



性別(モデルナ)-接種4回目1週間後



接種4回目1週間後アンケート回答者(モデルナ) N=159

調査概要

調査結果


I. アンケート回答者

1. 接種1回目当日
2. 接種1回目1週目
3. 接種1回目2週目
4. 接種2回目当日
5. 接種2回目1週目
6. 接種2回目2週目
7. 接種3回目当日
8. 接種3回目1週目
9. 接種3回目2週目
10. 接種4回目当日
11. 接種4回目1週目
12. 接種4回目2週目

II. 症状別

12-2.分析の対象（接種4回目2週間後）


接種4回目2週目アンケート




接種より2週間経過回答対象者：445人 内 回答有：179人 回答無：266人(回答率40.2%)

12-3.特性_全体（接種4回目2週間後）

年代別-接種4回目2週間後




性別-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者: N=179

12-4.特性_全体（接種4回目2週間後）

ワクチンメーカー別-接種4回目2週間後




都道府県別-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者：N=179

12-5.特性_メーカー別：ファイザー（接種4回目2週間後）

年代別(ファイザー)-接種4回目2週間後




性別(ファイザー)-接種4回目2週間後




接種4回目2週間後アンケート回答者(ファイザー): N=22

12-6.特性_メーカー別：モデルナ（接種4回目2週間後）

年代別(モデルナ)-接種4回目2週間後



性別(モデルナ)-接種4回目2週間後



接種4回目2週間後アンケート回答者(モデルナ) N=157


調査概要

調査結果


- I. アンケート回答者
 1. 接種1回目当日
 2. 接種1回目1週目
 3. 接種1回目2週目
 4. 接種2回目当日
 5. 接種2回目1週目
 6. 接種2回目2週目
 7. 接種3回目当日
 8. 接種3回目1週目
 9. 接種3回目2週目
 10. 接種4回目当日
 11. 接種4回目1週目
 12. 接種4回目2週目
- II. 症状別

13-2.症状_性別（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-3.症状_性別（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-4.症状_性別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-5.症状_性別：小児（5~11歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-6.症状_性別：10代（12～19歳）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体：N=222 男性：111 女性：108 その他：2

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体：N=62 男性：27 女性：35 その他：0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体：N=190 男性：93 女性：95 その他：2


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体：N=63 男性：29 女性：34 その他：0

13-7.症状_性別：10代（12～19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-8.症状_性別：10代（12～19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-9.症状_性別：20代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-10.症状_性別：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-11.症状_性別：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-12.症状_性別：30代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-13.症状_性別：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



全体: N=198 男性:101 女性:95 その他:0


接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




全体: N=188 男性:98 女性:90 その他:0

13-14.症状_性別：30代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-15.症状_性別：40代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-16.症状_性別：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-17.症状_性別：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-18.症状_性別：50代（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=209 男性: 118 女性: 91 その他: 0

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




全体: N=78 男性: 47 女性: 31 その他: 0

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=206 男性: 115 女性: 91 その他: 0


接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）



全体: N=51 男性: 49 女性: 32 その他: 0


13-19.症状_性別：50代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



全体：N=211 男性：114 女性：97 その他：0


接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




全体：N=228 男性：121 女性：105 その他：0

13-20.症状_性別：50代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-21.症状_性別：60代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-22.症状_性別：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-23.症状_性別：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-24.症状_性別：70代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-25.症状_性別：70代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-26.症状_性別：70代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-27.症状_性別：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-28.症状_性別：80代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-29.症状_性別：80代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-30.症状_メーカー別 (接種1・2回目)


接種1回目1週間後 (接種日 ~7日目まで)




接種2回目1週間後 (接種日 ~7日目まで)



接種1回目2週間後 (8日目 ~14日目まで)




接種2回目2週間後 (8日目 ~14日目まで)




13-31.症状_メーカー別（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



全体：N=859 ファイザー：140 モデルナ：582 武田(ノババックス)：137


接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




全体：N=834 ファイザー：140 モデルナ：568 武田(ノババックス)：126

13-32.症状_メーカー別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目 ~14日目まで）



13-33.症状_メーカーの組み合わせ別（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）

- 接種1・2回目:ファイザー 接種3回目:ファイザー
- 接種1・2回目:ファイザー 接種3回目:モデルナ
- 接種1・2回目:ファイザー 接種3回目:武田(ノバリス)
- 接種1・2回目:モデルナ 接種3回目:ファイザー
- 接種1・2回目:モデルナ 接種3回目:モデルナ
- 接種1・2回目:モデルナ 接種3回目:武田(ノバリス)




接種3回目アンケート回答者（1週前および2週間回答者）

接種1回目	接種2回目	接種3回目	n
ファイザー	ファイザー	ファイザー	93
モデルナ	モデルナ	ファイザー	20
ファイザー	ファイザー	モデルナ	260
モデルナ	モデルナ	モデルナ	179
ファイザー	ファイザー	武田(ノバリス)	68
モデルナ	モデルナ	武田(ノバリス)	38

13-34.症状_メーカーの組み合わせ別（接種3回目）

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）

- 接種1・2回目:ファイザー 接種3回目:ファイザー
- 接種1・2回目:ファイザー 接種3回目:モデルナ
- 接種1・2回目:ファイザー 接種3回目:武田(ノバリス)
- 接種1・2回目:モデルナ 接種3回目:ファイザー
- 接種1・2回目:モデルナ 接種3回目:モデルナ
- 接種1・2回目:モデルナ 接種3回目:武田(ノバリス)






接種3回目アンケート回答者（1週目および2週目回答者）

接種1回目	接種2回目	接種3回目	N
ファイザー	ファイザー	ファイザー	93
モデルナ	モデルナ	ファイザー	20
ファイザー	ファイザー	モデルナ	260
モデルナ	モデルナ	モデルナ	178
ファイザー	ファイザー	武田(ノバリス)	68
モデルナ	モデルナ	武田(ノバリス)	38

13-35.症状_メーカーの組み合わせ別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）：接種1・2回目ファイザー





接種4回目アンケート回答者（1週目および2週目回答者）

接種1回目	接種2回目	接種3回目	接種4回目	計
ファイザー	ファイザー	ファイザー	ファイザー	5
ファイザー	ファイザー	ファイザー	モダерна	13
ファイザー	ファイザー	モダерна	ファイザー	8
ファイザー	ファイザー	モダерна	モダерна	16
ファイザー	ファイザー	武田(ノババックス)	ファイザー	0
ファイザー	ファイザー	武田(ノババックス)	モダерна	0

13-36.症状_メーカーの組み合わせ別（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）：接種1・2回目モデルナ






接種4回目アンケート回答者（1週目および2週目回答者）

接種1回目	接種2回目	接種3回目	接種4回目	計
モデルナ	モデルナ	ファイザー	ファイザー	3
モデルナ	モデルナ	ファイザー	モデルナ	1
モデルナ	モデルナ	モデルナ	ファイザー	4
モデルナ	モデルナ	モデルナ	モデルナ	43
モデルナ	モデルナ	薬種（ノババックス）	ファイザー	0
モデルナ	モデルナ	薬種（ノババックス）	モデルナ	0

13-37.症状_メーカーの組み合わせ別（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種1・2回目ファイザー





接種4回目アンケート回答者（1週目および2週目回答者）

接種1回目	接種2回目	接種3回目	接種4回目	計
ファイザー	ファイザー	ファイザー	ファイザー	5
ファイザー	ファイザー	ファイザー	モダерна	13
ファイザー	ファイザー	モダерна	ファイザー	8
ファイザー	ファイザー	モダерна	モダерна	16
ファイザー	ファイザー	英国(AZ11922x3)	ファイザー	0
ファイザー	ファイザー	英国(AZ11922x3)	モダерна	0

13-38.症状_メーカーの組み合わせ別（接種4回目）

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）：接種1・2回目モデルナ




接種4回目アンケート回答者（1週目および2週目回答者）


接種1回目	接種2回目	接種3回目	接種4回目	数
モデルナ	モデルナ	ファイザー	ファイザー	0
モデルナ	モデルナ	ファイザー	モデルナ	1
モデルナ	モデルナ	モデルナ	ファイザー	4
モデルナ	モデルナ	モデルナ	モデルナ	48
モデルナ	モデルナ	武蔵シノバックス	ファイザー	0
モデルナ	モデルナ	武蔵シノバックス	モデルナ	0

13-39.症状_メーカー別：小児（5~11歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-40.症状_メーカー別：10代（12 ~19歳）（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日 ~7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-41.症状_メーカー別：10代（12 ~19歳）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-42.症状_メーカー別：10代（12 ~19歳）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-43.症状_メーカー別：20代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-44.症状_メーカー別：20代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-45.症状_メーカー別：20代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-46.症状_メーカー別：30代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-47.症状_メーカー別：30代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-48.症状_メーカー別：30代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-49.症状_メーカー別：40代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-50.症状_メーカー別：40代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-51.症状_メーカー別：40代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-52.症状_メーカー別：50代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-53.症状_メーカー別：50代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日 ~7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目 ~14日目まで）




13-54.症状_メーカー別：50代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-55.症状_メーカー別：60代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-56.症状_メーカー別：60代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-57.症状_メーカー別：60代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-58.症状_メーカー別：70代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-59.症状_メーカー別：70代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-60.症状_メーカー別：70代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-61.症状_メーカー別：80代（接種1・2回目）


接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-62.症状_メーカー別：80代（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




13-63.症状_メーカー別：80代（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



13-64.症状別：発症日（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目




*本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

13-65.症状別：発症日（接種3回目）



*本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。


13-66.症状別：発症日（接種4回目）




*本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

13-67.症状別：発症日（接種1・2回目）

接種1回目




接種2回目




*本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。

13-68.症状別：発症日（接種3回目）



*本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。


13-69.症状別：発症日（接種4回目）



*本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。


13-70.症状別：最も高い熱（37.5 以上の発熱をした方のみ）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1489

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=548

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後アンケート回答者：N=508

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-71.症状別：最も高い熱（37.5 以上の発熱をした方のみ）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者：N=659

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-72.症状別：最も高い熱（37.5 以上の発熱をした方のみ）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=183


接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種4回目2週間後アンケート回答者：N=173

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-73.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種1・2回目）




* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
 * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-74.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種3回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
 * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-75.症状別：最も腫れた日（腫れた方対象）（接種4回目）



* 本データは、接種後1週目と2週目の両者の回答があったもののみについて集計の上、頻度を算出している。
 * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-76.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1489

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=548

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後アンケート回答者：N=508

* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-77.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-78.症状別：赤く腫れたサイズ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-79.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1489

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=548

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後アンケート回答者：N=508


* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-80.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）



* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-81.症状別：注射部位の化膿（腫れた方対象）（接種4回目）



* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-82.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1489

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=548

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後アンケート回答者：N=508


* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-83.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-84.症状別：注射部位の硬化（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）



* グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-85.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種1・2回目）

接種1回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種1回目1週間後アンケート回答者：N=1489

接種2回目1週間後（接種日～7日目まで）




接種2回目1週間後アンケート回答者：N=548

接種1回目2週間後（8日目～14日目まで）



接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

接種2回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種2回目2週間後アンケート回答者：N=508

* 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
 * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
 * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-86.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種3回目）

接種3回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種3回目1週間後アンケート回答者 (N=858)

接種3回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種3回目2週間後アンケート回答者 (N=834)

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値


13-87.症状別：リンパ節の部位の腫れ（腫れた方対象）（接種4回目）

接種4回目1週間後（接種日～7日目まで）



接種4回目1週間後アンケート回答者：N=183

接種4回目2週間後（8日目～14日目まで）




接種4回目2週間後アンケート回答者：N=179

- * 主な部位（耳の後ろ、首、腕、脇）は選択式、複数回答可。その他の部位について、自由入力も可能
- * 回答の無かった部位については、グラフの項目から省略している。
- * グラフ上の数値は回答者全体を100%とした場合の数値

13-88.症状別：受診状況（接種1・2回目）

接種1回目




未受診(1338人)
96.7%

接種当日	2人	0.1%
接種翌日	2人	0.1%
3日目	1人	0.1%
4日目	4人	0.3%
5日目	0人	0.0%
6日目	3人	0.2%
7日目	3人	0.2%
8日目	3人	0.2%
9日目	7人	0.5%
10日目	4人	0.3%
11日目	1人	0.1%
12日目	3人	0.2%
13日目	0人	0.7%
14日目	4人	0.3%
未受診	1,338人	96.7%

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1384

接種2回目




未受診(501人)
98.4%

接種当日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	1人	0.2%
4日目	0人	0.0%
5日目	2人	0.4%
6日目	1人	0.2%
7日目	1人	0.2%
8日目	1人	0.2%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	0人	0.0%
12日目	0人	0.0%
13日目	1人	0.2%
14日目	1人	0.2%
未受診	501人	98.4%

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=508

13-89.症状別：受診状況（接種3回目）

接種3回目




未受診(818人)
98.1%

接種当日	0人	0.0%
接種翌日	1人	0.1%
3日目	2人	0.2%
4日目	0人	0.0%
5日目	2人	0.2%
6日目	1人	0.1%
7日目	1人	0.1%
8日目	2人	0.2%
9日目	1人	0.1%
10日目	2人	0.2%
11日目	2人	0.2%
12日目	2人	0.2%
13日目	0人	0.0%
14日目	0人	0.0%
未受診	818人	98.1%

接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834

13-90.症状別：受診状況（接種4回目）

接種4回目



接種日別	人数	割合
接種翌日	0人	0.0%
接種翌日	0人	0.0%
3日目	0人	0.0%
4日目	0人	0.0%
5日目	0人	0.0%
6日目	0人	0.0%
7日目	0人	0.0%
8日目	0人	0.0%
9日目	0人	0.0%
10日目	0人	0.0%
11日目	3人	1.7%
12日目	1人	0.6%
13日目	0人	0.0%
14日目	2人	1.1%
未受診	173人	96.3%

接種4回目2週間後アンケート回答者：N=179

13-91.症状別：診断結果（接種1回目）

診断結果

風邪	6人
うつ病	2人
肺炎	1人
喘息	1人
胸の筋肉痛	1人
腰痛で受診、腰の動きが悪くなってる、すぐ出る	1人
腰痛	1人
不整脈、頻脈、最低血圧105、最高血圧155	1人
病名なし、問題ないと診断	1人
鼻骨折	1人
半身痺れはワクチン後遺症	1人
晴になし、ワクチンの副作用と考えられる。	1人
頭痛	1人
潰瘍性大腸炎の定期検診でした。	1人
胆嚢ヘルニア	1人
虫歯	1人
体調変化	1人
足の痛みがあり、整形外科を受診。コロナールを処方され、様子を見るようにと、病名は告げられず。	1人
整形外科受診してください。	1人
睡眠不足や過度のストレスにより、胸の痛みや息苦しさの増加。	1人

接種1回目と2回目後アンケート回答者 n=1384

13-92.症状別：診断結果（接種1回目）

診断結果

腎結石の疑いだったが何もなかった	1人
診断名は分かりませんが、口の中全体に口内炎が出来るまで。	1人
診断なし	1人
食道がん	1人
痛	1人
歯肉の炎症	1人
腫瘍	1人
喉が少し痛い	1人
悪疽	1人
夏風邪	1人
喉痛症	1人
胃腸炎	1人
異常なし 定期受診のため	1人
てんかんの定期検診	1人
ただの熱っぽい	1人
ストレス性の胃炎	1人
コロナ陽性でした	1人
アレルギー定期	1人
ありません	1人
B型肝炎の検査のみ	1人
未受診	1,338人

接種1回目2週間後アンケート回答者 N=1384

13-93.症状別：診断結果（接種2回目）

診断結果

風邪	3人
扁桃腺炎	1人
不精	1人
咳嗽症	1人
喉風邪	1人
胃腸炎	1人
未受診	501人

13-94.症状別：診断結果（接種3回目）

診断結果

感染症	2人
副反応や基礎疾患による体調不良	1人
副作用に関する相談	1人
循環器内科：胸の正気感により受診。異常なし。泌尿器科：排尿時の痛みと残尿感により受診。膀胱炎の診断。	1人
検査中のためまだわかりません	1人
腫瘍が17日にあり。血糖マーカー検査で異常反応がでて。泌尿器科のかかりつけ医を予約受診待ち	1人
腎臓型腫瘍	1人
筋肉痛	1人
気管支炎	1人
顔のかぶれ腫れ	1人
胃炎	1人
ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)	1人
なし	1人
コロナウイルス陽性	1人
コロナ性帯状疹	1人
未受診	818人

13-95.症状別：診断結果（接種4回目）

診断結果

肺炎	2人
不病	1人
経過観察	1人
一過性全盲発症	1人
コロナ感染	1人
未受診	179人

13-96.症状別：入院日（接種1・2回目）

接種1回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種1回目2週間後アンケート回答者：N=1364

接種2回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種2回目2週間後アンケート回答者：N=909

13-97.症状別：入院日（接種3回目）

接種3回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種3回目2週間後アンケート回答者：N=834

13-98.症状別：入院日（接種4回目）


接種4回目

入院日	人数	割合
接種当日	0	0.0%
接種翌日	0	0.0%
3日目	0	0.0%
4日目	0	0.0%
5日目	0	0.0%
6日目	0	0.0%
7日目	0	0.0%
8日目	0	0.0%
9日目	0	0.0%
10日目	0	0.0%
11日目	0	0.0%
12日目	0	0.0%
13日目	0	0.0%
14日目	0	0.0%

接種4回目2週間後アンケート回答者 N=179


13-99.症状別：3回目の体調（2回目に比べて）：3回目ファイザー（接種3回目）

接種1-2回目：ファイザー 接種3回目：ファイザー



接種3回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：ファイザー(N=112)


接種1-2回目：モデルナ 接種3回目：ファイザー



接種3回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：ファイザー(N=27)


13-100.症状別：3回目の体調（2回目に比べて）：3回目モデルナ（接種3回目）

接種1-2回目：ファイザー 接種3回目：モデルナ



接種3回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：モデルナ(N=317)


接種1-2回目：モデルナ 接種3回目：モデルナ



接種3回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：モデルナ(N=237)


13-101.症状別：3回目の体調（2回目に比べて）：3回目武田（ノババックス）（接種3回目）

接種1-2回目：ファイザー 接種3回目：武田（ノババックス）



接種3回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：武田（ノババックス）：N=74


接種1-2回目：モデルナ 接種3回目：武田（ノババックス）



接種3回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：武田（ノババックス）：N=41

13-102.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー（接種4回目）

接種1-2回目：ファイザー 接種3回目：ファイザー 接種4回目：ファイザー



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：ファイザー、接種4回目：ファイザー、N=0


接種1-2回目：モデルナ 接種3回目：ファイザー 接種4回目：ファイザー



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：ファイザー、接種4回目：ファイザー、N=0

13-103.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー（接種4回目）

接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：モデルナ、接種4回目：ファイザー



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：モデルナ、接種4回目：ファイザー (n=11)

接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：モデルナ、接種4回目：ファイザー



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：モデルナ、接種4回目：ファイザー (n=5)


13-104.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目ファイザー（接種4回目）

接種1~2回目：ファイザー 接種3回目：武田（ノババックス） 接種4回目：ファイザー



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1~2回目：ファイザー、接種3回目：武田（ノババックス）、接種4回目：ファイザー (n=0)


接種1~2回目：モデルナ 接種3回目：武田（ノババックス） 接種4回目：ファイザー



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1~2回目：モデルナ、接種3回目：武田（ノババックス）、接種4回目：ファイザー (n=0)

13-105.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ（接種4回目）

接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：ファイザー、接種4回目：モデルナ



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：ファイザー、接種4回目：モデルナ (N=17)


接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：ファイザー、接種4回目：モデルナ



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：ファイザー、接種4回目：モデルナ (N=1)


13-106.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ（接種4回目）

接種1-2回目：ファイザー 接種3回目：モデルナ 接種4回目：モデルナ



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：ファイザー、接種3回目：モデルナ、接種4回目：モデルナ；N=60

接種1-2回目：モデルナ 接種3回目：モデルナ 接種4回目：モデルナ



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1-2回目：モデルナ、接種3回目：モデルナ、接種4回目：モデルナ；N=55


13-107.症状別：4回目の体調（3回目に比べて）：4回目モデルナ（接種4回目）

接種1~2回目：ファイザー 接種3回目：武田（ノババックス） 接種4回目：モデルナ



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1~2回目：ファイザー、接種3回目：武田（ノババックス）、接種4回目：モデルナ：N=0

接種1~2回目：モデルナ 接種3回目：武田（ノババックス） 接種4回目：モデルナ



接種4回目2週間後アンケート回答者かつ接種1~2回目：モデルナ、接種3回目：武田（ノババックス）、接種4回目：モデルナ：N=0